

Asthma

& the Over 65s

Capture Forme libre

An information paper for health professionals



©2013

Table 3. Considerations when choosing inhaler devices for older patients

Problem	Solution
Reduced maximal inspiratory flow	Consider pMDI alone or with spacer. Avoid dry-powder inhalers.
Reduced manual dexterity	Consider pMDI with spacer or dry-powder inhaler. Avoid pMDI without spacer.
Inability to coordinate actuation and inhaling	Consider pMDI with spacer or dry-powder inhaler. Avoid pMDI without spacer.
Inability to form effective seal with lips around mouthpiece	Use spacer plus face mask.
Osteoarthritis of hands	Consider a <i>Haleraid</i> with a pMDI.

pMDI: pressurised metered-dose inhaler

Multiples affections neuromusculaires favorisent l'inocclusion labiale .L'atteinte du nerf VII(Sangle labio-jugale) et du nerf v(muscles masticateurs)sont les plus fréquentes(1).



(1)Lézy J P, Princ G. Paris : Masson ; 1997..
Pathologie maxillo-faciale et stomatologie

Parkinson et séquelles d'accident vasculaire cérébral avec atteinte des muscles labio-glosso-pharyngés et troubles salivaires (1) (2)

Capture rectangulaire



- Atonie musculaire faciale ;posture mandibulaire pathologique.
- Altération de la fonction orale tel que la succion et la sensibilité orale
- Sialorrhée compromet la fermeture complète des lèvres..
(Stase souvent diurne discordant avec ;xérostomie nocturne, consistance salivaire est modifiée)..

1) Giess R, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000 ; 69 : 121-3.

2) Friedman A, Parkinsonism and Related Disorders 2001 ; 7 : 329-32